



**ESPERIENZE DI PRATICA CLINICA
DEL PAZIENTE METASTATICO
ORMONO-SENSIBILE NELL'APPROCCIO
ALLA CHEMIOTERAPIA:
DICIAMOCITUTTO**

**4 APRILE 2025 ROMA
DONNA CAMILLA SAVELLI**

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

**ORION
PHARMA**



**Responsabile Scientifico
DANIELE SANTINI**

Policlinico Umberto I° Sapienza Università di Roma

INFORMAZIONI GENERALI SEDE

Donna Camilla Savelli
Via Garibaldi, 27
00153 Roma

ISCRIZIONI

L'iscrizione al corso è gratuita, potrà avvenire esclusivamente attraverso procedura online sul nostro sito: www.mitcongressi.it

**NON SARÀ GARANTITA LA
POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI PRESSO
LA SEDE CONGRESSUALE**

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVIDER 1509



MI&T srl - Centro Direzionale Bolomna
Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna
info@mitcongressi.it
www.mitcongressi.it



FACULTY

Maria Bassanelli
IFO, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Chiara Ciccarese
Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Giuseppe Ferdinando Colloca
Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Serena Macrini
Ospedale Sandro Pertini

Michela Roberto
Policlinico Umberto I° Sapienza Università di Roma

Antonella Elena Rossi
Psicologa

Fiorenza Santamaria
Policlinico Umberto I° Sapienza Università di Roma

Daniele Santini
Policlinico Umberto I° Sapienza Università di Roma

Luciano Stumbo
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Negli ultimi decenni, l'incidenza del tumore prostatico è tra il più frequente nella popolazione maschile con età superiore ai 50 anni. La maggiore incidenza si registra nelle regioni del Nord - Italia (circa 100 nuovi casi per 100.000/Anno), contro gli 80 per 100.000/Anno nel Centro e 65 casi per 100.000/Anno nel Sud. Tale differenza si giustifica con la diversa diffusione del test del PSA (maggiore al Nord) e con la differente dieta, stile di vita e consumo di sostanze protettive come gli antiossidanti. La mortalità per cancro della prostata è invece in costante diminuzione (- 1,8% all'anno, da circa 20 anni). Il 30% degli uomini affetti da tumore alla prostata metastatico ormonosensibile sopravvive più di cinque anni dalla diagnosi. La maggior parte di questi pazienti va infatti incontro a una progressione della malattia; per questi soggetti si aprono nuove prospettive: il via libera da parte della Commissione Europea all'impiego dell'associazione alla terapia di deprivazione androgenica alla chemioterapia con docetaxel, per il trattamento dei pazienti con tumore della prostata avanzato ormonosensibile. Si allargano dunque le indicazioni: l'inibitore orale del recettore degli androgeni potrebbe diventare il nuovo standard di cura per i pazienti eleggibili.

- 14:30 **Registrazione partecipanti
welcome coffee**
- 15:00 **Benvenuto e inizio dei lavori**
D. Santini
- Moderatori: C. Ciccarese, L. Stumbo
- 15:20 **Il paziente fragile nel tumore metastatico**
G. F. Colloca
- 15:40 **Esperienze a confronto**
S. Macrini
- 16:00 **Discussione sui temi trattati**
- 16:10 **Tumore della prostata, nuovi farmaci e nuove
combinazioni nella malattia precoce metastatica:
cosa scegliere**
M. Roberto
- 16:30 **Esperienze a confronto**
F. Santamaria
- 16:50 **Discussione sui temi trattati**
- 17:00 **Tumore della prostata e l'impatto psicologico:
il follow-up della malattia e la qualità della vita**
A. E. Rossi
- 17:20 **Esperienze a confronto**
M. Bassanelli
- 17:40 **Discussione sui temi trattati**
- 18:00 **Take home messages e chiusura lavori**
D. Santini, C. Ciccarese, L. Stumbo
- 18:30 **Chiusura dei lavori**